

ED 治療の受けられる方は、下記の注意事項をよくお読み下さい。

- ① 当院では20歳以上の男性を処方の対象とさせていただきます。
- ② 狭心症などで、ニトログリセリンなどの硝酸剤（舌下錠、貼り薬、塗り薬、スプレーなど含む）で治療中の方は、服用しないで下さい。命にかかわる重篤な副作用をおこすことがあります、危険です。わからない場合はお薬を持参して下さい。
- ③ パートナーに服用する（している）ことをお伝え下さい。
- ④ 他の勃起不全治療（薬、器具など）ペニスの手術を受けた場合は申し出て下さい。
- ⑤ 次のような症状に気づいたら、服用をやめて医師に相談下さい。
 - ・バイアグラ錠によって「気分が悪くなる」「頭痛」「ほてり」「消化不良」「視覚障害（色が変わって見える）」などの副作用があらわれることがあります。
 - いつもの違う症状を感じた時は、当院にご相談下さい。
 - ・ペニスが損傷し、勃起機能を永続的に失うことがありますので、服用後、4時間以上勃起が続く場合はすぐ当院にご連絡下さい。
- ⑥ 決して他人に薬を譲り渡さないで下さい。
- ⑦ 性行為の約1時間前に服用して下さい。
- ⑧ 服用は1日1回までで、次の服用は24時間以上あけてください。
- ⑨ この薬は催淫剤（性欲増進剤）ではありません。
- ⑩ 他の科、医療期間を受診する時は、この薬を服用している事を必ず伝えて下さい。
- ⑪ 服用後は、性的刺激を受なければ、勃起しません。
- ⑫ 性行為感染症を防ぐ事はできません。

パレスクリニック 院長